



کلینیک دندانپزشکی دکتر اعتمادی فر

چنانچه مراقبتها را انجام دادید مشکلی برای دندان شما پیش آمد و تصور از جانب کلینیک باشد، تشریف بیارید و رایگان تصحیح بشود. ما همیشه هستیم و هر ناراحتی درد و مشکلی با درمانتان داشتید یک هفته یکماه یا سالها بعد، لطفا مراجعه کنید

اگر مشکلی دارید برای ما پیام بگذارید.

مراقبتهای پس از کف بندی

کف بندی چیست؟

گاهی پوسیدگی زیاد است به عصب نرسیده اما بسیار نزدیک عصب می باشد در این موارد تا دندان باز نشود مشخص نمی شود که آیا عصب کشی نیاز هست یا خیر. حال اگر پزشک باز کند پوسیدگی را بردارد و تشخیص بدهد که بهتر است عصب کشی شود پس درمان را ادامه و عصب کشی می کند گاهی پزشک تشخیص می دهد که نیاز به عصب کشی نیست برای اینکه هزینه اضافی به بیمار تحمیل نشود پزشک با مواد خاصی انتهای حفره را پر می کند . که حکم عایق را دارد اما به بیمار گفته می شود چنانچه درد ادامه پیدا کرد مراجعه کنند تا عصب کشی انجام شود ولی اگر درمان اثر کند و درد قطع شود که دیگر نیاز به مراجعه نیست. اما چنانچه درد دو هفته ادامه داشت باید برای عصب کشی مراجعه کنید.

مراقبت بعد از کف بندی همراه با ترمیم :

تا دو ساعت بعد از ترمیم هیچ چیزی نخورید چون امکان شکستن و رنگ گرفتن بسیار زیاد است . و تا 24 ساعت با سمتی که دندان ترمیم شده چیزی نجوید امکان شکستن بسیار زیاد است. مواد رنگی تابیست و چهار ساعت مصرف نکنید زیرا کامپوزیت رنگ میگیرد. مسواک و نخ مرتب بکشید . دندان شما پس از ترمیم امکان تخریب مجدد را دارد پس مسواک و نخ بسیار در ترمیم مهم است. بعد از ترمیم ممکنه ترمیم دندان بلند باشه اما بدلیل بی حس بودن دندان متوجه آن نشوید پس بعد از بی حسی و پس از گذشت 24 ساعت بجوید تا اگر بلند بود برای شما پالایش انجام شود. بلند بودن دندان باعث درد و شکستن دندان می شود پس اگر بلند بود جهت تصحیح حتما مراجعه نمایید. پس به این امر دقت نمایید. اگر چند روز بعد از ترمیم هنگام جویدن فشار یا درد داشتید نشانه ای بر بلندی ترمیم می باشد. خوردن ته دیگ شکستن آجیل ، مغز بادام و پسته سفت، نان خشک و ... می تواند به دندان ترمیم شده آسیب بزند پس حتی المقدور رعایت نمایید. لطفا این موضوع را مدنظر قرار دهید دندان ترمیم شده مثل چینی بند زده میباشد مسواک و نخ حتما رعایت شود تا دندان مجدد پوسیده نشود. بسیار دیده می شود

که عدم مراقبت باعث پوسیدگی دندان از سمت دیگر می شود بلکه عدم مراقبت شما می باشد. بعد از درمان تا مدتی حس ترکیدگی و فشار خواهید داشت پس نگران نباشید. چون مواد زیادی داخل دندان گذاشته میشود تا پس از کاهش حجم مشکلی جهت درمان بوجود نیاد. تا مدتها بعد از درمان حساسیت دندانی خواهید داشت ممکن است تا 6 ماه هم ادامه داشته باشد. دقت کنید در زمان انجام ترمیم بلند نشوید دهان را باز و بسته نکنید و اجازه بدهید بزاق توسط پزشک کنترل شود زیرا وجود بزاق باعث می شود ترمیم دندان بیفتد . اگر هنگام نخ دندان کشیدن مشکل داشتید یا گیر غذایی داشتید مراجعه بفرمایید .گاهی ناحیه مورد نظر به دلیل تزریق بی حسی متورم میشود و لپ جویده میشود درد و ناحتی بوجود می آورد مراقب باشید و این هیچ ربطی به درمان ندارد. این موضوع را مد نظر قراربدهید که دندان چند قسمت دارد اگر گوشه ای ترمیم شد و شما مراقبت نکنید ممکن است از گوشه ای دیگر مجدد پوسیده شده و این پوسیدگی تا زیر ترمیم قبلی برود و کلا ترمیم از دندان خارج شود پس دقت کنید که این موارد هیچ قصوری از سمت پزشک نیست. تمامی کارهای دندانپزشکی پنجاه پنجاه می باشند یعنی موفقیت درمان نصف با پزشک و نصف دیگر با بیمار است.