



Dr etemadifar Dental Clinic

مراقبت های دندانپزشکی اطفال

برای مراقبت و محافظت همیشگی از دندانهای
کودکانمان چه باید کرد؟

براساس تحقیقات **۷۵%** از کودکان سراسر دنیا،
دارای پوسیدگی و حفره دندان هستند.
این آمار **زنگ بیداری** است برای والدین و جامعه از
جهت **تشخیص زود هنگام و اهمیت دادن** به
سلامت دهان و دندان کودکان

کلینیک تخصصی دندانپزشکی
دکتر اعتمادی فر



براساس تحقیقات:

هر ساله، بیش از ۵۲ میلیون ساعت از تایم آموزش و مدرسه کودکان، صرف مشکلات دندانپزشکی آنها می شود.

با چکاپ منظم و رعایت بهداشت دهان و دندان از هزینه های اضافی جلوگیری کنیم.



۶ الی ۰۷۶-۳۲۲۱۰۷۹۳

کلینیک تخصصی دندانپزشکی
دکتر اعتمادی فر



تصویر فوق، دندانهای شیری کودکی را نشان می دهد که والدین او مراقبت های لازم را انجام نداده اند.

Dr etemadifar dental clinic

تصویر زیر دندانهای شیری سالم را نشان می دهد که گویای مراقبت های لازم از طرف والدین اوست.



والدین عزیز:

آیا می دانید کشیدن زود هنگام
دندانهای شیری کودکان باعث برهم
خوردن نظم و عدم رویش به موقع
دندانهای دائمی ست.....



برای مراقبت از دندان‌های شیری کودکان چه باید کرد؟

مصرف بسیار اندک شکلات و شیرینی توسط کودک

مسواک زدن و استفاده از نخ دندان

چکاپ منظم توسط دندانپزشک

والدین گرامی دندانهای شیری و دندانهای دایمی کودکان تا رده سنی **تا ۱۲ سال** از اهمیت به سزایی برخوردار است زیرا هرگونه عدم مراقبت می تواند مشکلات بزرگتری را در بزرگسالی بوجود بیاورد.


در اطفال دو بخش پیشگیری و درمان داریم

در **پیشگیری** علاوه بر مسواک زدن **فلوراید تراپی** و **فیشور سیلانت** و همچنین معاینات اولیه ارتودنسی از اهمیت زیادی برخوردار است.



در **فلوراید تراپی**، فلوراید روی تمامی سطوح دندان کشیده می شود تا از مینای دندان در مقابل پوسیدگیها مراقبت کند اما فلوراید تراپی باید به طور مرتب هر ۶ ماه انجام شود تا موثر باشد.

در **فیشور سیلانت** هدف مراقبت از دندانهای دایمی می باشد از سن حدود ۶ سال دندانهای دایمی که رشد کرده اند را مراقبت می کند به این صورت که مواد مخصوصی فقط داخل شیارهای عمیق دندان کشیده می شود تا شیارها بسته شوند و مانع پوسیدگی شود.



فیشورسیلانت



فلوراید تراپی

از دندانهای کودکانمان از طریق
فلوراید تراپی و فیشورسیلانت ،
محافظت کنیم...

تمامی این خدمات در کلینیک
دکتر اعتمادی فر انجام می گیرد.

اولین معاینه ارتودنسی در کودکان باید در سن ۷ سالگی باید صورت گیرد.

طی ارتودنسی پیشگیری، کودکان باید در سنین خیلی پایین تحت درمان قرار می‌گیرند (معمولا بین هفت تا یازده سال) و بهره کافی را از مراحل بعدی رشد دندان ببرند.

ارتودنسی زودهنگام از کشیده شدن یا جراحی دندان‌های بیشتر جلوگیری می‌کند و در نهایت با نتایج بهتری همراه است.



از کجا بفهمیم کودک ما به درمان ارتودنسی نیاز دارد؟

هنگامی که کودک به سن سه تا چهار سالگی می‌رسد به وضعیت دهان و دندان‌های او باید دقت داشته باشید. والدین برای پی بردن به علائم و نشانه‌هایی که نیاز به درمان ارتودنسی در کودکان را نشان می‌دهند، باید سؤالات زیر را از خود بپرسند:

- آیا بیشتر مواقع دهان کودک باز است؟
 - آیا کودک بیشتر از راه بینی تنفس می‌کند یا از راه دهان؟
 - آیا کودک برای بستن لب‌های خود از عضلات چانه استفاده می‌کند؟
 - آیا دندان‌های جلویی بالایی کودک بر روی لب پایینی یا جلوتر از آن قرار می‌گیرد؟
- در صورتی که پاسخ شما به هر یک از این پنج سؤال مثبت باشد، احتمالاً کودک شما نیاز به درمان برای اصلاح دندان‌ها، فکها و یا صورت دارد.

در صورتی که فکر می‌کنید کودک به درمان زود هنگام ارتودنسی نیاز دارد حتماً او را به ارتودنتیست نشان دهید تا وضعیت رشد فک و صورت و دندان‌هایش بررسی شده و در صورت لزوم مداخله به موقع انجام شود.



چگونه عادت های ناصحیح در کودکان باعث

ناهنجاری های دندان در آنها می شود:

ناهنجاری اپن بایت در کودکان:

عوامل ایجاد اپن بایت :

به طور کلی سه عامل مهم در ناهمراستایی دندان ها و ناهنجاری اپن بایت نقش دارند. در برخی موارد این وضعیت در اثر مشکلات ساختاری استخوان فک ایجاد می شود. همچنین برخی کودکان به واسطه دندان بندی مختلف دچار اپن بایت می شوند و هنگامی که تمامی دندان های شیری با دندانهای دائمی جایگزین می شود این وضعیت برطرف می شود..

عادات دهانی نامناسب نیز می تواند باعث اپن بایت شود. عادت به نام فشار زبان اغلب در ایجاد اپن بایت نقش دارد. فشار زبان به فشار دادن زبان به دندانهای جلویی در هنگام صحبت کردن یا بلعیدن گفته می شود

در اوایل کودکی عادت فشار زبان امری طبیعی و متداول است اما هنگامی که کودک بزرگتر می شود خود به خود این عادت را با الگوی بلع طبیعی جایگزین می کند.. عادات دیگری مانند مکیدن انگشت و جویدن اشیای خارجی مانند ته مداد نیز می توانند باعث اپن بایت شوند.

در برخی موارد استفاده نامناسب از پستانک یا شیشه شیر نیز می تواند احتمال بروز این مال اکلوژن را افزایش دهد. مکیدن انگشت در نوزادان امری طبیعی است و ۵۰٪ نوزادان انگشت خود را می مکند اما این عادت به محض بیرون زدن دندان های دائمی مشکل ساز می شود.

استفاده از پستانک برای نوزادان بعد از سن ۳ سالگی عوارضی را بدنبال دارد:

تاثیر منفی روی ساختمان فک و دندان ها


باعث ایجاد اختلال در بلع میشود.

همچنین جلوزدگی فک

تغییر حالت دندان ها

تنگی قوس فک بالا





کلینیک تخصصی دندانپزشکی
دکتر اعتمادی فر

۶ الی ۰۷۶-۳۲۲۱۰۷۹۳

آیا می دانید یکی از مشکلات بیماران مبتلا به تنگی کام
بوی بد دهان است.

تا قبل از سن بلوغ امکان عریض کردن کام تنگ
بوسیله درمان ارتودنسی وجود دارد.

تا دیر نشده برای معاینه کام فرزندانتان توسط متخصص
ارتودنسی اقدام نمایید.



D
r
e
t
e
m
a
d
i
f
a
r



**بسیاری از کودکان بدلیل
ترس از دندانپزشکی
سلامت دندانهای خود را
به خطر می اندازند....**

**برای غلبه بر ترس کودکان
چه باید کرد؟**

ایجاد تجربه دندانپزشکی بدون درد و خونریزی

استفاده از دستگاه کوییک اسلیپر در کلینیک، برای کودکان،
این تجربه را واقعیت می بخشد....



استفاده از دستگاه کوییک اسلیپر یا دستگاه تزریق بدون درد در کلینیک

این دستگاه بسیار مدرن فرانسوی کار برای کسانی که ترس از آمپول بی حسی دارن بسیار راحت کرده .
این دستگاه برای اطفال و بزرگسال قابل استفاده می باشد.
اگر شما جز کسانی هستید که فقط به دلیل ترس از آمپول بی حسی به دندانپزشک مراجعه نمی کنید با این دستگاه می تونید یک حس عالی و تجربه عالی تر از دندانپزشکی داشته باشید.

مزایا:

تزریق بدون درد و ناراحتی.
بسیار سریع.

استفاده از ماده بی حسی بسیار کمتر نسبت به آمپول.
مثل آمپول بی حس شدن و کج شدن صورت و لب، بعد از کار ندارد.

لطفاً اگر ترس از بی حسی دارید این دستگاه تجربه کنید.



ارائه خدمات دندانپزشکی اطفال در کلینیک دکتر اعتمادی فر

- فلوراید تراپی
- فیشورسیلانت
- ارتودنسی

با استفاده از دستگاه کوئیک اسلیپر
(بی حسی بدون درد)
و خدمات ارتودنسی تحت نظر متخصص
ارتودنسی صورت می گیرد.

ویزیت و معاینه رایگان می باشد.

بندرعباس ، چهارراه سازمان به سمت
بلوکی ، طبقه فوقانی بانک انصار

۶ الی ۰۷۶-۳۲۲۱۰۷۹۳

Dr_etemadifar